


لا تؤجل التطعيم



توصي الجمعية الأمريكية للسرطان بتطعيم جميع الأطفال ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بين الأعمار من ٩ إلى ١٢ للمساعدة في الوقاية من ستة أنواع من السرطان.

هل كنت
تعلم...

يمكن أن يمنع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أكثر من ٩٠٪ من حالات السرطان إذا أُعطي في الوقت المناسب.



العمر مهم

عندما تقوم بتطعيم طفلك في الوقت المناسب، فإنك تساعد في حمايته من سرطانات فيروس الورم الحليمي البشري. ويكون لقاح HPV أكثر فعالية إذا أُعطي قبل سن ١٣.

سيمنع التطعيم في الأعمار الموصى بها عددًا أكبر من السرطانات مقارنة بالتطعيم في سن متأخرة.



التطعيم التداخلي والمتأخر
الأعمار من ١٥ إلى ٢٦
٣ جرعات

الجرعة الأولى في الزيارة الأولى
الجرعة الثانية بعد ١ إلى ٢ شهرًا
الجرعة الثالثة بعد ٦ أشهر من
الجرعة الأولى



متأخر
الأعمار من ١٣ إلى ١٤
جرعتان
بين كل جرعة والأخرى
من ٦ إلى ١٢ شهرًا



في الوقت المناسب
الأعمار من ٩ إلى ١٢
جرعتان

بين كل جرعة والأخرى
من ٦ إلى ١٢ شهرًا