



Es verdad:

Mujeres, ustedes pueden ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino.

Una de las mejores cosas que usted puede hacer para evitar el cáncer de cuello uterino es hacerse exámenes de detección de rutina para este tipo de cáncer.

La prueba de Papanicolaou busca cambios en el cuello uterino que podrían convertirse en cáncer. Al tratar estos cambios, la mayoría de los cánceres de cuello uterino puede detenerse antes de que se originen. Los cambios en el cuello uterino que pueden resultar en cáncer por lo general son causados por un virus llamado virus del papiloma humano (VPH). Las infecciones por el VPH pueden resultar en cáncer de cuello uterino (entre otros tipos de cáncer).

Su médico o enfermera pueden indicarle con qué frecuencia hacer las pruebas de detección para el cáncer de cuello uterino.

Si usted tiene más de 30 años de edad, debe hacerse una prueba de VPH al mismo tiempo que su prueba de Papanicolaou para ver si tiene los tipos de VPH que pueden causar cáncer.

Las mujeres que no se hacen exámenes de detección, o que no se hacen dichos exámenes con la periodicidad con la que deberían hacerlo, tienen probabilidades más altas de desarrollar cáncer de cuello uterino.

Si usted tiene cáncer de cuello uterino, hacerse las pruebas de detección puede ayudar a detectarlo temprano, cuando es pequeño y posiblemente más fácil de tratar.

La mayoría de las personas no sabe si tiene el VPH, por eso es importante hacer los exámenes de detección periódicamente.

Incluso si se ha aplicado la vacuna contra el VPH y/o si ha terminado de tener hijos, aun así necesita continuar haciendo las pruebas de Papanicolaou y del VPH hasta cumplir los 65 años.

Para obtener más información sobre el VPH y cómo se asocia al cáncer de cuello uterino, visite [cancer.org/papiloma](https://www.cancer.org/papiloma) o llame a la Sociedad Americana Contra El Cáncer al **1-800-227-2345**.