

放射治疗副作用



Every cancer. Every life.®

外照射放射治疗利用高能射线杀灭癌细胞。若邻近正常细胞受损，放疗可能引发副作用。

接受放射治疗的患者会出现一些常见副作用，如疲劳和皮肤问题。但其他副作用则取决于身体的治疗部位。例如，肺部放射治疗可能导致呼吸问题；而前列腺放射治疗可能引发排尿困难，因为膀胱紧挨着前列腺。

此处列出的副作用通常在首次治疗后一周左右出现。多数症状会在治疗结束后数月内缓解，但部分可能持续更久。治疗过程中您不会有任何感觉。以下是针对不同身体部位放射治疗可能出现的副作用：



脑部

头痛、脱发、眩晕、恶心呕吐、听力下降、皮肤及头皮变化、记忆力与语言

能力障碍



头部和颈部

口腔咽喉溃疡、口干、吞咽困难、味觉改变、恶心或呕吐、耳痛、龋齿、牙龈肿胀、咽喉或颈部肿胀、头面部脱发或下颌僵硬



肺部、胸部及乳房

咽喉疼痛、吞咽困难、胃灼热、食欲不振、咳嗽、胸痛、呼吸困难、乳房胀痛或肿胀、手臂水肿（淋巴水肿）



盆腔（膀胱、前列腺、宫颈、卵巢、子宫）

便秘、腹泻、排尿困难或尿痛、生育障碍或性功能障碍（性交疼痛、性欲减退或勃起功能障碍）



胃、结肠和直肠

恶心或呕吐、胃灼热、腹痛或绞痛、腹泻或便秘



皮肤

发红、酸胀、肿胀、干燥、水疱、脱皮、疼痛、瘙痒或脱发

请向您的癌症治疗团队咨询：针对您的癌症类型，哪些副作用最常见？在放疗期间及结束后可能出现哪些症状？



要了解关于放射治疗副作用应对方法的更多信息，请访问American Cancer Society网站 cancer.org/chinese 或致电 1-800-227-2345。我们随时为您提供支持。



cancer.org | 1.800.227.2345

©2025, American Cancer Society, Inc.
No. CH1085903 Rev. 11/25

