



Avis aux femmes :

Vous pouvez prévenir le cancer du col de l'utérus.

Women, you can prevent cervical cancer – French

L'une des meilleures choses à faire pour éviter le cancer du col de l'utérus, c'est de faire régulièrement un dépistage.

Les tests de dépistage du cancer du col de l'utérus sont le test VPH et le test Pap ou frottis vaginal. Le test VPH recherche les infections dues aux types de VPH qui peuvent provoquer des précancres et des cancers du col de l'utérus. Le test Pap examine les cellules prélevées dans le col de l'utérus pour rechercher des changements qui pourraient être un cancer ou un précancer.

Votre médecin ou infirmière peut vous dire à quelle fréquence vous devez effectuer des tests.

Si vous avez entre 25 et 65 ans, vous devriez effectuer un test de dépistage primaire du VPH (virus du papillome humain) tous les 5 ans (c'est mieux). Si vous ne pouvez pas le faire, effectuez un test conjoint (un test VPH avec un test Pap) tous les 5 ans ou un test Pap tous les 3 ans.

Des tests de dépistage réguliers peuvent aider à trouver des changements avant qu'ils ne deviennent cancéreux, et peuvent également

aider à la détection précoce d'un cancer du col de l'utérus, lorsqu'il est de petite taille et peut être plus facile à traiter.

La plupart des gens ne savent pas s'ils sont infectés par le VPH, donc il est important de se faire tester régulièrement.

Même si vous avez reçu un vaccin contre le VPH ou que vous ne projetez plus d'avoir des enfants, vous devez continuer à réaliser un dépistage régulier jusqu'à l'âge de 65 ans.

Pour plus d'informations sur le cancer du col de l'utérus, visitez **cancer.org** ou appelez l'American Cancer Society au numéro **1-800-227-2345**.